

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата КонтрСекс Нео капли для кошек и сук

Общие сведения:

Торговое наименование: КонтрСекс Нео капли для кошек и сук (Con-trSex Neo guttae ex catta et canis). Международное непатентованное наименование: ацетобумедон и этинилэстрадиол.

КонтрСекс Нео капли для кошек и сук - лекарственный препарат в форме раствора для перорального применения. Лекарственный препарат в качестве действующих веществ содержит: ацетобумедон – 1,2 мг и этинилэстрадиола – 0,01 мг; а в качестве вспомогательного компонента соевое масло. Выпускают КонтрСекс Нео капли для кошек и сук расфасованным по 2,0; мл в полимерные флаконы-капельницы с крышкой контроля первого вскрытия.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года со дня изготовления. Датой изготовления лекарственного препарата считают дату расфасовки.

КонтрСекс Нео капли для кошек и сук запрещается применять по истечении срока годности.

КонтрСекс Нео капли для кошек и сук хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 25°С. КонтрСекс Нео капли для кошек и сук следует хранить в местах, недоступных для детей. Использованные флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

Фармакологические свойства:

КонтрСекс Нео капли для кошек и сук – препарат, предназначенный для регуляции половой охоты у кошек и сук. Входящий в состав лекарственного препарата гестаген – ацетобумедон – блокирует в гипоталамусе медиобазальные зоны, высвобождающие гонадолиберины (фолликулостимулирующий и лютеинизирующий релизинг гормоны), которые являются пусковым механизмом секреции гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, ответственных за развитие в яичниках фолликулов и их овуляцию. Эстроген - этинилэстрадиол в комплексе с ацетобумедоном усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной слизи, вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

Ацетобумедон и этинилэстрадиол быстро всасываются в кишечнике и,

биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

КонтрСекс Нео капли для кошек и сук по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

Порядок применения:

Лекарственный препарат применяют кошкам и сукам для регуляции половой охоты (прерывания и задержки течки) и предотвращения нежелательной беременности. Лекарственный препарат вводят перорально, капая в рот или на лакомство. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу на обороте инструкции).

КонтрСекс Нео капли для кошек и сук противопоказан беременным и кормящим самкам, животным, не достигшим половой зрелости, при новообразованиях молочной железы, половых органов, сахарном диабете, мочекаменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата.

Не рекомендуется кошкам и сукам давать лекарственный препарат, предназначенный для котов и кобелей и, наоборот, вследствие различного гормонального фона женских и мужских особей.

Молодым животным в первую течку применять не рекомендуется из-за трудности определения времени начала половой охоты.

Через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции животных.

Симптомы передозировки не описаны.

Побочных явлений и осложнений, а также привыкания к лекарственному препарату при применении КонтрСекс Нео капли для кошек и сук в соответствии с настоящей Инструкцией не наблюдается. При индивидуальной непереносимости компонентов препарата применение его прекращают.

КонтрСекс Нео капли для кошек и сук совместимы со всеми лекарственными препаратами.

Таблица 1

Вид животного	Назначение ЛП		Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Начало приема	Примечания
Кошки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	До 5 кг	4 капли	1 раз в день в течение 3-5 дней	При появлении первых признаков половой охоты	1. Неэффективно применение лекарственного препарата, если с момента начала течки прошло более 2-х дней. 2. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного продлить курс применения препарата на один день. 3. В отдельных случаях применение лекарственного пре-
			5,1-10 кг	4-8 капель			

							парата продлевают до полного прекращения половой охоты. 4.Рекомендуется проводить курс прерывания половой охоты не более 2-х раз в год.
		Задержка течки	Независимо от массы тела животного	4 капли	Регулярно 1 раз в 10-14 дней	В период покоя или через 10 дней после исчезновения признаков половой охоты	1.Продолжительность курса по задержке течки не более 18 месяцев.
	Предотвращение нежелательной беременности после случайного спаривания		Независимо от массы тела животного	8 капель	1 раз в день в течение 2 дней	Не позднее 24 часов после случайного спаривания	Более поздний срок дачи лекарственного препарата значительно снижает эффект воздействия.
Вид животного	Назначение ЛП		Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Начало приема	Примечания
Коты	Регуляция половой охоты	Прекращение половой охоты	До 5 кг 5,1-10 кг	4 капли 4-8 капель	1 раз в день в течение 3-5 дней	При появлении первых признаков половой охоты	1.Неэффективно применение лекарственного препарата, если с момента начала половой охоты прошло более 2-х дней. 2. Молодым котам в первый день курса назначают 2 капли, далее по схеме. 3.Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного продлить курс применения препарата на один день. 4.В отдельных случаях применение лекарственного препарата продлевают до полного прекращения половой охоты.
		Поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	4 капли			

Кобели	Регуляция половой охоты	Прекращение половой охоты	до 5 кг	2 капли	2 раза в день, с интервалом 12 ч в течение 5-7 дней	При появлении первых признаков половой охоты	1. Неэффективно применение лекарственного препарата, если с момента начала половой охоты прошло более 2-х дней. 2. Молодым кобелям в первый день курса назначают двойную дозу одновременно, далее по схеме. 3. Наилучший эффект достигается, если после успокоения животного продлить курс применения препарата на один день. 4. В отдельных случаях применение лекарственного препарата продлевают до полного прекращения половой охоты.
			5,1-10 кг	2-4 капли			
			10,1-30 кг	4-12 капель			
			свыше 30 кг	12+2 капли на каждые последующие 5 кг массы тела			

Меры личной профилактики:

При работе с КонтрСекс Нео капли для кошек и сук следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании применения следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки его следует тотчас смыть струей воды, при попадании внутрь – обратиться к врачу. Специфический антидот отсутствует. Лечение симптоматическое.

Инструкция разработана ООО «НВП «Астрафарм», г. Москва.
 ООО «НВП «Астрафарм», г. Москва, Научный проезд, д.20
 тел.: (495) 785-83-50