

СОГЛАСОВАНО



Заместитель  
Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

13.1.2023

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Экспресс Успокоин® таблетки

(Организация-разработчик: ООО «НПК «СКиФФ»; 117246, г. Москва,  
Научный проезд д. 20, стр.3, эт. 2, пом. 204)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-6.20-4662 № ПВР-3-6.20/03554

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Экспресс Успокоин® таблетки (Express Uspokoin tabulettae).

международное непатентованное наименование: сукцинат тразодона.

2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

Лекарственный препарат выпускают в двух дозировках, содержащих в качестве действующего вещества сукцинат тразодона.

Экспресс Успокоин® таблетки для кошек и для собак мелких пород (масса таблетки 103 мг) – 24 мг сукцината тразодона на таблетку (в пересчете на тразодон – 18,24 мг).

Экспресс Успокоин® таблетки для собак средних и крупных пород (масса таблетки 515 мг) – 120 мг сукцината тразодона на таблетку (в пересчете на тразодон – 91,2 мг).

В качестве вспомогательных веществ Экспресс Успокоин® таблетки содержат: микрокристаллическую целлюлозу, лактозы моногидрат, натрий кроскармеллозу, повидон, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, смесь для покрытия оболочкой и пищевую добавку со вкусом мяса.

3. По внешнему виду Экспресс Успокоин® таблетки представляют собой таблетки круглой формы от светло-зеленого до темно-зеленого цвета с фаской, риской на одной стороне и логотипом «У» на другой стороне, покрытые пленочной оболочкой.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства.

Экспресс Успокоин® таблетки запрещается применять по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 2 таблетки в блистеры, которые помещают в картонную пачку по 1 или 3 блистера.

Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Хранить Экспресс Успокоин® таблетки следует в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре не выше 25 °С.

6. Экспресс Успокоин® таблетки следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Экспресс Успокоин® таблетки относится к лекарственным средствам клинико-фармакологической группы антидепрессанты.

10. При попадании в организм действующее вещество сукцинат тразодона распадается на два активных составляющих: тразодон и сукцинат (анион янтарной кислоты).

Тразодон относится к классу антагонистов/ингибиторов обратного захвата серотонина. Он действует как антагонист на серотониновые рецепторы 5-HT2A подтипа и, как частичный агонист 5-HT1A – рецепторов. Обладает явно выраженным блокирующим эффектом воздействия на α1 –адренорецепторы. Тразодон оказывает воздействие на 5-HT2C – рецепторы и на α2-адренергические рецепторы.

Тразодон, обладая седативным, анксиолитическим, миорелаксирующими действиями, снижает выраженность или подавляет проявление страха, беспокойства, соматические симптомы тревоги: учащенное сердцебиение, слюноотделение, чрезмерная двигательная активность, вокализация (лай, мяуканье), деструктивное поведение, оказывает успокаивающее действие, уменьшает напряженность. Не оказывает холинолитического действия.

Тразодон показывает положительный эффект при коррекции поведения кошек и собак с прогрессирующими возрастными когнитивными нарушениями, клинически проявляющимися тревожностью с чрезмерной вокализацией, нарушением цикла сна и бодрствования, дезориентацией в пространстве, асоциальным и нечистоплотным поведением.

Абсорбция тразодона из желудочно-кишечного тракта после приема внутрь высокая, действие наблюдается через 30 - 40 минут. Прием препарата во время или сразу после кормления замедляет скорость абсорбции тразодона, снижает его концентрацию в плазме крови и пролонгирует время достижения максимальной концентрации. Тразодон проникает через гистогематические барьеры, а также в ткани и жидкости (желчь, слюна, молоко), метаболизируется в печени путем гидроксилирования и окисления с участием изоферментов цитохрома p450 (CYP3A4, CYP3A5 и CYP3A7) с образованием метаболитов, в том числе активного метаболита – м-хлорофенилпиперазина. Выводится из организма главным образом в виде неактивных метаболитов, в основном с мочой (около 75 %) и частично - с желчью.

Сукцинат, воздействуя на нервную систему, моделирует активность ферментов клеточных мембран (кальцийнезависимой фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы) и receptorных комплексов (бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхолинового), способствуя их связыванию с лигандами, сохранению структурно-функциональной организации биомембран. Таким образом сукцинат поддерживает транспорт нейромедиаторов и улучшению синаптической передачи; повышает концентрацию в головном мозге дофамина, усиливает компенсаторную активацию аэробного гликолиза.

Наличие сукцината в составе лекарственного препарата снижает показатель токсичности и, в связи с этим, уменьшает количество нежелательных реакций.

Применение тразодона в форме соли янтарной кислоты способствует уменьшению времени наступления терапевтического эффекта за счет быстрой растворимости.

Экспресс Успокоин® таблетки по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

В рекомендуемых дозах препарат не оказывает мутагенного, канцерогенного и сенсибилизирующего действия.

### III. Порядок применения

11. Экспресс Успокоин® таблетки назначают собакам и кошкам для быстрого снижения возбуждения при стрессах и тревоге, вызываемых транспортировкой, громкими звуками, разлукой с хозяином, посещением ветеринарных клиник и пребыванием в условиях стационара, поведенческих проблемах, связанных с проявлениями половой охоты у кошек и котов (при сохранении репродуктивной способности).

12. Противопоказанием для применения являются: повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе, заболевания сердечно-сосудистой системы и эпилепсия.

Клинических исследований у животных с нарушениями функции печени и почек не проводилось.

13. При применении Экспресс Успокоин® таблеток следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Экспресс Успокоин® таблетками.

Таблетки покрыты оболочкой со вкусом мяса, что облегчает пероральное применение препарата, делает работу ветеринарного врача с препаратом наиболее безопасной за счет снижения выраженности агрессивных реакций и защитных рефлексов со стороны животного.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

В случае проявления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или упаковку).

14. Не следует применять препарат самкам в период беременности и вскармливания приплода, а также новорожденным щенкам и котятам.

15. Экспресс Успокоин® таблетки применяют перорально. За счет специального покрытия со вкусом мяса таблетка, как правило, поедается животным самостоятельно в небольшой порции корма. В случае отказа животного от самостоятельного поедания препарата таблетка применяется принудительно на корень языка.

Применение препарата Экспресс Успокоин® таблетки рекомендуется не позднее, чем за 30 минут до основного кормления, либо через 2-4 часа после основного кормления.

При применении препарата Экспресс Успокоин® таблетки сразу после основного кормления терапевтический эффект наступает с задержкой.

#### ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СОБАК

Действие препарата наступает уже в течение 30-40 минут и достигает полного эффекта через 60 минут. Для достижения стабильного эффекта при купирования страха транспортировки, разлуки с хозяином, разового посещения мероприятий и ветеринарных клиник, громких звуков препарат рекомендуется применять собакам однократно, в дозе по массе тела за 60 минут до воздействия стресс-фактора.

Экспресс Успокоин® таблетки применяют животным в разовой терапевтической дозе 6-12 мг сукцинат тразодона на 1 кг массы тела. Разовые дозы препарата Экспресс Успокоин® таблетки для собак указаны в таблице 1. При необходимости продления терапевтического эффекта допускается повторная дача препарата через 6-8 часов.

Таблица 1

| Масса собаки, кг | Разовая доза для собак препарата Экспресс Успокоин® таблетки   |   |
|------------------|--|---|
|                  | Количество таблеток, штук                                      |   |
|                  | масса таблетки - 103 мг<br>(сукцинат тразодона<br>24 мг/табл.) | масса таблетки - 515 мг<br>(сукцинат тразодона<br>120 мг/табл.) |
| 2,0              | 1/2  | -   |
| 2,1 – 4,0        | 1  | -   |
| 4,1 – 6,0        | 1 1/2  | -   |
| 6,1 – 9,0        | 2  | -   |
| 9,1 – 12,0       | 2 1/2  | 1/2   |
| 12,1 – 21,0      | -  | 1   |
| 21,1 – 30,0      | -  | 1 1/2   |
| 30,1 – 40,0      | -  | 2   |
| свыше 40,0       | -  | 2+1/2 таблетки на каждые<br>10 кг массы собаки                  |

Суточная доза не должна превышать 28 мг/кг веса собаки. При исследовании переносимости повышенных доз препарата Экспресс Успокоин® таблетки на собаках в течение 380 дней нежелательных реакций не зарегистрировано. Допускается ежедневное применение препарата в рекомендуемых инструкцией дозах в течение 380 дней. Применение препарата свыше 380 дней возможно после решения лечащего ветеринарного врача.

### ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ КОШЕК

Действие препарата наступает уже в течение 30-40 минут и достигает полного эффекта через 60 минут. Для достижения стабильного эффекта при купировании страха транспортировки, разлуки с хозяином, разового посещения мероприятий и ветеринарных клиник, громких звуков препарат рекомендуется применять кошкам однократно, в дозе по массе тела за 60 минут до воздействия стресс-фактора.

Экспресс Успокоин® таблетки применяют кошкам в разовой терапевтической дозе 6-12 мг сукцината тразодона на 1 кг массы тела. Разовые дозы препарата Экспресс Успокоин® таблетки для кошек указаны в таблице 2. При необходимости продления терапевтического эффекта допускается повторная дача препарата через 6-8 часов.

Таблица 2

| Разовая доза для кошек препарата Экспресс Успокоин® таблетки |   |
|--|---|
| Масса кошки, кг  | Количество таблеток массой 103 мг<br>(сукцинат тразодона - 24 мг/табл.), штук |
| до 2,0   | 1/2   |
| 2,1 – 4,0  | 1   |
| 4,1 – 6,0  | 1 <sup>1/2</sup>  |
| 6,1 - 8,0  | 2   |
| свыше 8,0 кг   | 2+1/2 таблетки на каждые 2 кг массы тела кошки                                |

Суточная доза не должна привышать 25 мг/кг веса кошки. При исследовании переносимости повышенных доз препарата Экспресс Успокоин® таблетки на кошках в течение 380 дней нежелательных реакций не зарегистрировано. Допускается ежедневное применение препарата в рекомендуемых инструкцией дозах в течение 380 дней. Применение препарата свыше 380 дней возможно после решения лечащего ветеринарного врача.

Для коррекции полового поведения котов и кошек (вокализация, принятие позы спаривания у кошек, усиление агрессии, мечение территории у котов) препарат Экспресс Успокоин® таблетки применяют в дозах по массе тела 1 раз в день, ежедневно, до полного прекращения половой охоты совместно с гестаген-эстрогенными ветеринарными препаратами для гормональной регуляции половой охоты.

16. При применении Экспресс Успокоин® таблеток может возникать седативное действие, которое проходит самостоятельно и не требует медикаментозной коррекции. Нежелательных реакций за время проведения

клинических исследований препарата Экспресс Успокоин® таблетки не зарегистрировано. При наступлении реакций индивидуальной гиперчувствительности или индивидуальной непереносимости компонентов препарата животному назначается соответствующее лечение.

17. При передозировке препарата более чем в три раза в сравнении с терапевтической дозой могут наблюдаться рвота, сонливость, понижение артериального давления, нарушение функции желудочно-кишечного тракта. В этих случаях животному назначают энтеросорбенты и симптоматические средства в соответствии с инструкциями по применению.

18. Лекарственный препарат Экспресс Успокоин® таблетки усиливает действие препаратов, угнетающих центральную нервную систему, повышает риск кровотечений при применении нестероидных противовоспалительных средств.

Противогрибковые препараты азольной группы (кетоконазол, флуконазол, итраконазол) и макролидные антибиотики (в том числе тилозин, тилмикозин, азитромицин) увеличивают концентрацию тразодона за счет ингибирования фермента CYP3A4, в связи с этим необходимо снижение его дозы в 2 раза. Ингибиторы моноаминооксидазы (MAO) - повышают риск развития серотонинового синдрома (рвота, диарея, депрессия, кома).

19. При первом применении препарата Экспресс Успокоин® таблетки могут возникать явления седации (заторможенность, сонливость, нарушение координации движений), которые не требуют лечения и проходят самопроизвольно в течение первых трех дней применения. При отмене препарата нежелательных реакций не зарегистрировано.

20. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата его применение возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Экспресс Успокоин® таблетки не предназначены для применения продуктивным животным.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Наименование производственной производителя препарата для применения. | и | адрес площадки лекарственного ветеринарного | ООО «НВП «Астрафарм»: 117246, г. Москва, Научный проезд д. 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50. |
|---|---|---|---|

|  |  |
|--|--|
| Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения препарата на принятие претензий от потребителя. | ООО «НВП «Астрафарм»: 117246, г. Москва, Научный проезд д. 20, стр. 3, эт. 3, пом. I, ком. 35 Тел/факс: (495) 785-83-50. |
|--|--|

Директор ООО «НПК «СКиФФ»



Т. В. Берштайнис

# ЭКСПРЕСС УСПОКОИН

Покупайте на OZON



Успокоительные таблетки для кошек Экспресс Успокоин, 2 шт



Успокоительные таблетки для кошек Экспресс Успокоин, 6 шт



Успокоительные таблетки для собак мелких пород  
Экспресс Успокоин, 6 шт



Успокоительные таблетки для собак средних и крупных пород  
Экспресс Успокоин, 6 шт

Купить на OZON

Купить на OZON

Купить на OZON

Купить на OZON

Узнайте больше и подберите дозировку на [uspokoin.ru](http://uspokoin.ru)