

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

А.А. САВЕНКОВ

01 ФЕВ 2023

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук

(организация-разработчик ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва  
Научный проезд, дом 20, строение 3, этаж 3, помещение I, комната 35)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-11.15-3932№ПВР-3-6.0/02597

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук  
(ContrSex Neo tabulettae pro cattarum et canum feminarum).

международное непатентованное наименование действующих веществ:  
бутират мепрегенаола, этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь.

КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук в качестве действующих веществ в 1 таблетке массой 100 мг содержат: ацетобумедон (бутират мепрегенаола) - 0,120 мг и этинилэстрадиол – 0,001 мг.

В качестве вспомогательных веществ КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук содержат: лактозу, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция стеарат, краситель пищевой.

3. По внешнему виду КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук представляет собой таблетки овальной формы, светло-желтого или кремового цвета, с логотипом «Neo» с одной стороны.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук запрещается применять по истечении срока годности.

4. КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук выпускают расфасованными по 5 таблеток в блистере. 2 блистера по 5 таблеток помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

5. Хранить КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук следует в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается по рецепту.

## II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10. КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук – бигормональный контрацептивный лекарственный препарат, содержащий в качестве действующих веществ гормоны: гестаген – ацетобумедон и эстроген – этинилэстрадиол.

Ацетобумедон блокирует в гипоталамусе медиобазальные зоны, высвобождающие гонадолиберин который является пусковым механизмом секреции гипофизом фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, ответственных за развитие в яичниках фолликулов и их овуляцию.

Этинилэстрадиол в комплексе с ацетобумедоном усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной слизи, вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

Действующие вещества лекарственного препарата хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

## III. Порядок применения

11. Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук применяют для регуляции половой охоты:

- кошкам - для прерывания течки и поддержания успокаивающего эффекта (задержки течки), а также для предотвращения нежелательной беременности;

- сукам – для прерывания и задержки течки, а также для предотвращения нежелательной беременности.

12. Препарат противопоказан животным, не достигшим половой зрелости, беременным и кормящим самкам, а также при новообразованиях молочной железы, заболеваниях половых органов, сахарном диабете, мочекаменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов.

13. При применении лекарственного препарата КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой

с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу, его необходимо смыть водой с мылом. В случае проявления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или упаковку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается применять для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Запрещается применение лекарственного препарата КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук в период беременности и лактации, а также потомству до достижения половозрелого возраста.

15. Лекарственный препарат вводят перорально с кормом или принудительно на корень языка. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Вид животного	Назначение ЛП		Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Примечания	
Кошки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	До 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	1. Применяют при первых признаках половой охоты, но не позднее 2-х дней с момента ее начала. 2. Рекомендуется проводить курс прерывания половой охоты не более 2-х раз в год.	
			5,1-10 кг	1-2 таблетки			
		Поддержание успокаивающего эффекта (задержка течки)	Независимо от массы тела животного	1 таблетка	Регулярно 1 раз в 10-14 дней		1. Начало приема - в период покоя или через 10 дней после исчезновения признаков половой охоты. 2. Может проводиться регулярно без перерывов.
	Предотвращение нежелательной беременности после спаривания		Независимо от массы тела животного	2 таблетки	Двукратно с интервалом 24 часа		Применяют не позднее 24 часов после случайного спаривания.
Суки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	до 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 5-7 дней	1. Применяют при первых признаках половой охоты, но не позднее 2-х дней с момента ее начала. 2. Прерывание течки рекомендуется проводить не более 1-го раза в год. 3. Прерывание течки рекомендуется проводить не более 1-го раза в год.	
			5,1-10 кг	1-2 таблетки			
		Задержка течки	10,1-30 кг	2-4 таблетки	1 раз в день в течение 7 дней		1. Применяют за 7-14 дней до предполагаемой течки. 2. Данный курс позволяет сдвинуть течку примерно на 20-40 дней. 3. Задержку течки рекомендуется проводить не более 2-х раз в год.
	Предотвращение нежелательной беременности после спаривания		свыше 30 кг	4+1 таблетка на каждые последующие 10 кг массы тела	Двукратно с интервалом 24 часа		Применяют не позднее 24 часов после случайного спаривания.

Молодым животным в первую течку применять не рекомендуется из-за трудности определения времени начала половой охоты.

Через 2 – 3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

19. Особенности действия лекарственного препарата КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук при первом применении или при отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата, его следует применить как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме. При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

21. КонтрСекс Neo® таблетки для кошек и сук не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителей лекарственного препарата для ветеринарного применения.

1. ООО «НПК «СКИФФ», 117246, г. Москва, Научный проезд дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

2. ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва, Научный проезд дом 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3, этаж 3, пом. I, ком. 35. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Заместитель директора  
ООО «НВП «Астрафарм»



А.О. Сиротюк