



## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
СЕКС БАРЬЕР® капли

(Организация-разработчик ООО «НПК «СКИФФ»; 117246, г. Москва,  
Научный проезд дом 20, строение 3, этаж 2, помещение 204)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-29.13-3659№ПВР-3-0.3/01205

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: СЕКС БАРЬЕР® капли (SEX BARRIER guttae).

международное непатентованное наименование действующих веществ: мепрегенолацетат, этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

СЕКС БАРЬЕР® капли выпускают в двух дозировках, содержащих в качестве действующих веществ в 1 мл:

- «для кошек»: мепрегенолацетат водорастворимый – 1,00 мг и этинилэстрадиол - 0,01 мг;

- «для котов»: мепрегенолацетат водорастворимый – 4,00 мг и этинилэстрадиол - 0,20 мг.

В качестве вспомогательного вещества СЕКС БАРЬЕР® капли содержат: оливковое масло.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-жёлтого, зеленовато-жёлтого или золотисто-жёлтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства.

СЕКС БАРЬЕР® капли запрещается применять по истечении срока годности.

4. СЕКС БАРЬЕР® капли выпускают расфасованными по 2 мл во флаконы полиэтиленовые с насадками-дозаторами. Флакон полиэтиленовый укупоривают навинчиваемой крышкой с контролем первого вскрытия, упаковывают в блистер и поштучно упаковывают в картонные пачки с инструкцией по применению.

5. Хранят СЕКС БАРЬЕР® капли в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. СЕКС БАРЬЕР® капли следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: отпускается по рецепту.

## II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.
10. СЕКС БАРЬЕР® капли - бигормональный контрацептивный лекарственный препарат, содержащий в качестве действующих веществ гормоны: гестаген – мепрегнолацетат водорастворимый и эстроген – этинилэстрадиол.

Мепрегнолацетат водорастворимый и этинилэстрадиол, воздействуя на гипоталамо-гипофизарную систему животных, снижают секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Вследствие этого происходит угнетение фолликулогенеза в яичниках и прекращается овуляция фолликулов.

Этинилэстрадиол в комплексе с мепрегнолацетатом водорастворимым усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной среды, повышает вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки. У котов снижается уровень тестостерона, а, следовательно, половая активность.

Действующие вещества лекарственного препарата хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

СЕКС БАРЬЕР® капли по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм животных.

## III. Порядок применения

11. Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® капли применяют кошкам для регуляции половой охоты (прерывания и задержки течки), предотвращения нежелательной беременности; котам для регуляции половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения, мечения территории.

12. Препарат противопоказан беременным и кормящим самкам, животным, не достигшим половой зрелости, при новообразованиях молочной железы, заболеваниях половых органов, при сахарном диабете, мочекаменной болезни и индивидуальной непереносимости компонентов препарата.

13. При применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы вымыть руки теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское

учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или упаковку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Применение лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли беременным самкам, в период лактации, а также у потомства до достижения ими половозрелого возраста запрещено.

15. СЕКС БАРЬЕР® капли применяют перорально, капая на корень языка, на нос или в корм. Дозировка зависит от массы животного и цели применения (см. таблицу):

Таблица

Вид животного	Назначение препарата		Масса тела животного	Дозировка	Курс применения	Начало приема	Примечания
Кошки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	До 5 кг	4 капли 1 раз в день	3-5 дней	Не позднее 2 дней с момента начала течки	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неэффективно применение препарата, если с момента начала течки прошло более 2 дней.</li> <li>2. Успокоение животного наступает после полного курса применения.</li> <li>3. В отдельных случаях применение препарата продлевают до полного прекращения половой охоты.</li> <li>4. Повторный курс проводится по необходимости.</li> </ol>
			Свыше 5 кг	5-7 капель 1 раз в день			
	Задержка течки, поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	4 капли 1 раз в день	Регулярно 1 раз в 14 дней	В период полового покоя или через 10 дней после исчезновения признаков половой охоты	Может проводиться регулярно без перерывов.	
	Предотвращение нежелательной беременности		Независимо от массы тела животного	8 капель 1 раз в день	Однократно	Не позднее 24 часов после спаривания	Более поздний срок дачи препарата значительно снижает эффект воздействия.
Коты	Регуляция половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения, мечения территории	Прерывание половой охоты	До 5 кг	4 капли 1 раз в день	4-6 дней	Не позднее 2 дней с момента начала половой охоты	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неэффективно применение препарата, если с момента начала половой охоты прошло более 2 дней.</li> <li>2. Молодым котам в первый день курса назначают 6-8 капель, далее по схеме.</li> <li>3. В отдельных случаях применение препарата продлевают до полного прекращения половой охоты.</li> <li>4. Повторный курс проводится по необходимости.</li> </ol>
			Свыше 5 кг	5-7 капель 1 раз в день			
	Поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	4 капли 1 раз в день	Регулярно 1 раз в 14 дней	В период полового покоя	Может проводиться регулярно без перерывов.	

Молодым самкам в первую течку применять не рекомендуется из-за трудности определения времени начала половой охоты.

Через 2-3 месяца после отмены препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

16. Побочных явлений и осложнений при применении СЕКС БАРЬЕР® капль в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

17. Симптомы передозировки при применении СЕКС БАРЬЕР® капль не установлены.

18. Информация об особенностях взаимодействия СЕКС БАРЬЕР® капль с другими лекарственными препаратами отсутствует.

19. Особенности действия препарата при первом применении или при отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата, его следует применить как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме.

При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

21. СЕКС БАРЬЕР® капли не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

ООО «НПК «СКиФФ», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 3, этаж 3, помещение I, комната 35. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Директор ООО «НПК «СКиФФ»

Т. В. Берштайнис

